



EASTWOOD

734H000116

PEAK EASTWOOD-ET

AltaHOTJOB X DENVER X BALISTO

H0840M003205436426 | 出生日期 2019/4/27

K-酪蛋白 AA | β-酪蛋白 A2A2

单倍型 HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0

Genetic Codes TC TD TE TL TP TR TV TY

aAa 321 | DMS 234,123 | EFO 11.1% | RHA 99%

当前验证 USA-202404

CDCB & HA-USA Genetic Evaluations 04/2024

| 体型结构 根据 0 女儿在 0 群 (81% Rel) |  |      |    |        |   |       |   |  |  |
|-----------------------------|--|------|----|--------|---|-------|---|--|--|
| 体型预期传递力                     |  | 1.92 |    | 乳房综合指数 |   | 1.66  |   |  |  |
| 体重综合指数                      |  | 0.13 |    | 肢蹄综合指数 |   | 0.69  |   |  |  |
|                             |  | -2   | -1 | 0      | 1 | 2     |   |  |  |
| 体高                          |  |      |    |        |   | +1.40 | 高 |  |  |
| 强壮度                         |  |      |    |        |   | +0.34 | 强 |  |  |
| 体深                          |  |      |    |        |   | +0.29 | 深 |  |  |
| 乳用特征                        |  |      |    |        |   | +1.19 | 开 |  |  |
| 尻角度                         |  |      |    |        |   | -0.70 | 掀 |  |  |
| 髀宽度                         |  |      |    |        |   | +0.58 | 宽 |  |  |
| 后肢侧视                        |  |      |    |        |   | +0.43 | 弯 |  |  |
| 后肢后视                        |  |      |    |        |   | +0.78 | 直 |  |  |
| 蹄角度                         |  |      |    |        |   | +1.28 | 陡 |  |  |
| 肢蹄评分                        |  |      |    |        |   | +0.96 | 高 |  |  |
| 前乳房附着                       |  |      |    |        |   | +2.05 | 强 |  |  |
| 后乳房高度                       |  |      |    |        |   | +2.37 | 高 |  |  |
| 后乳房宽度                       |  |      |    |        |   | +2.23 | 宽 |  |  |
| 乳房初带                        |  |      |    |        |   | +0.86 | 强 |  |  |
| 乳房深度                        |  |      |    |        |   | +1.59 | 浅 |  |  |
| 前乳头位置                       |  |      |    |        |   | +0.84 | 近 |  |  |
| 后乳头位置                       |  |      |    |        |   | +0.90 | 近 |  |  |
| 乳头长度                        |  |      |    |        |   | -0.88 | 短 |  |  |

| 系谱   |                             |
|------|-----------------------------|
| 父亲   | PEAK ALTAHOTJOB-ET          |
| 母亲   | ENDCO EXACTA-ET             |
| 外祖父  | MR MOGUL DENVER 1426-ET     |
| 外祖母  | ROYAL-VISTA BALISTO ESTA-ET |
| 外曾祖父 | DE-SU 11236 BALISTO-ET      |
| 外曾祖母 | ROYAL-VISTA EPIC ESTELLE-ET |

| 综合性能指数 |  |  | 净价值 |  |
|--------|--|--|-----|--|
| 2717   |  |  | 661 |  |

| 产量  |         |         |         |       |
|-----|---------|---------|---------|-------|
| 产奶量 | +1052 磅 | 89% 可靠性 | 奶酪价值\$  | \$673 |
| 乳蛋白 | +53 磅   | +0.07%  | 液态奶价值\$ | \$559 |
| 乳脂肪 | +65 磅   | +0.08%  | GM\$    | \$642 |

| 根据 43 女儿在 7 群 (100% 美国女儿数) |          |      |  |
|----------------------------|----------|------|--|
| 产奶量-美国女儿                   | +28417 磅 | 100% |  |
| 乳脂率-美国女儿                   | +1198 磅  | 4.2% |  |
| 蛋白量-美国女儿                   | +969 磅   | 3.4% |  |

| 健康           |       |             |       |
|--------------|-------|-------------|-------|
| 生产寿命         | +1.5  | 繁殖指数        | -0.7  |
| 成母牛生存力       | -1.1  | 女儿怀孕率       | -1.7  |
| 青年牛生存力       | +0.5  | 成年母牛受胎率     | -0.5  |
| 体细胞评分        | +2.96 | 青年母牛受胎率     | 2.6   |
| MAST         | 2.0%  | KETO        | 2.4%  |
| METR         | 0.8%  | RETP        | -0.1% |
| DA           | 0.4%  | MFEV        | -0.1% |
| 饲料节约指数       | 153   | Zoetis WT\$ | \$32  |
| Zoetis DWP\$ | \$763 | Zoetis CW\$ | \$38  |

| 产犊性状    |      |         |         |      |         |
|---------|------|---------|---------|------|---------|
| 公牛配种易产性 | 2.0% | 80% 可靠性 | 公牛配种死胎率 | 6.4% | 67% 可靠性 |
| 女儿产犊易产性 | 2.2% | 70% 可靠性 | 女儿产犊死胎率 | 4.9% | 65% 可靠性 |